

INSTRUKCJA POBRANIA MATERIAŁU

Badanie parazytologiczne – Antygen Lamblii

Przygotowanie się pacjenta do pobrania próbki kału oraz sposób jej pobrania, przechowywania i transportu mają bardzo duży wpływ na wiarygodność wyniku. Dlatego należy zastosować się do poniższych zaleceń:

- Wynik badania nie będzie wiarygodny, gdy materiał do badania będzie pobrany podczas przyjmowania: antybiotyków, leków przeciwgrzybiczych, leków przeciwgorączkowych oraz leków odrobaczających. Badanie można wykonać po upływie przynajmniej 2 tygodni od chwili zakończenia leczenia.
- Przed oddaniem kału przeznaczonego do badania należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy. Kał nie powinien mieć kontaktu z wodą, moczem czy też środkami czystości.

Pobranie materiału - Do badania należy pobrać próbki kału z kilku miejsc.

Wyjąć z pudełka plastikowy, sterylny pojemnik na kał.

1. Przy pomocy plastikowej łopatki należy pobrać próbki z kilku miejsc oddanej porcji stolca. Pojemnik powinien być wypełniony maksymalnie do $\frac{1}{4}$ wysokości.
2. Pojemnik należy szczelnie zamknąć.
3. Do momentu transportu próbkę z materiałem należy przechowywać w chłodnym miejscu w temperaturze 2-8° C.
4. Probówkę z pobranym materiałem oraz czytelnie i poprawnie wypełnionym skierowaniem należy zapakować do pudełka oraz wysłać dowolną firmą kurierską w dniach poniedziałek-czwartek na adres laboratorium:

Laboratorium Al-Med
ul. Przedborska 2
97-500 Radomsko